

Dipl.-Math. Dipl.-Inform. Ingo Schulz  
Dipl.-Math. Marco Wilhelm  
Dr. Hubert Wagner  
Andrej Dudenhefner, M. Sc.

Sommersemester 2014

## Mathematik für Informatiker 2 Übungsblatt 2

**Ausgabe:** 7. April, **Abgabe:** 14. April, 12 Uhr, **Block A**

Bitte schreiben Sie auf Ihre Abgabe Namen, Matrikelnummer und Gruppe auf. Die Abgabe werfen Sie bitte in den passenden Briefkasten (auf Gruppennummer achten!) in der Otto Hahn Straße 20 ein.

Ihre Gruppennummer erfahren Sie im Assess-System, nachdem die Anmeldungen zu den Übungen abgeschlossen sind. Dies wird am Nachmittag des 11.04.2014 erfolgen.

Ab sofort wird es auf jedem Übungsblatt eine Bonusaufgabe geben, die freiwillig zu bearbeiten ist, d. h. die erhältlichen Punkte sind zusätzliche Bonuspunkte, die nicht zu den 100% der Punkte des jeweiligen Blocks gehören.

### Aufgabe 2.1 (4 Punkte)

a) Rechnen Sie folgende Gleichungen nach:

$$\begin{aligned}1^2 &= 1^3 \\(1 + 2)^2 &= 1^3 + 2^3 \\(1 + 2 + 3)^2 &= 1^3 + 2^3 + 3^3 \\(1 + 2 + 3 + 4)^2 &= 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 \\&\vdots\end{aligned}$$

b) Finden Sie das erste  $n \in \mathbb{N}$ , für das die Gleichung

$$(1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n)^2 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3$$

nicht mehr gilt. Falls Ihnen dies nicht möglich ist, erläutern und beweisen Sie, warum.

### Aufgabe 2.2 (4 Punkte)

Bestimmen Sie eine Summenformel für die Summe  $1 + 4 + 7 + \dots + (3n + 1)$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$  und beweisen Sie sie mittels vollständiger Induktion.

**Aufgabe 2.3** (4 Punkte)

Für eine natürliche Zahl  $n$  betrachte man die Aussage

1.  $A(n) : n^2 - 5n + 4 \geq 0$
2.  $A(n) : n + 1 \geq 2n$
3.  $A(n) : 2^n > n^2$
4.  $A(n) : 3^{2^n} < 2^{3^n}$

- a) Für welche  $n \in \mathbb{N}$  ist der Induktionsschluss „ $A(n) \Rightarrow A(n+1)$ “ gültig? Begründen Sie Ihre Antwort!
- b) Für welche  $n \in \mathbb{N}$  ist die Aussage  $A(n)$  wahr? Begründen Sie Ihre Antwort!

**Bonusaufgabe 2.4** (4 Bonuspunkte) De Morgansche Regeln

Sei  $M$  eine Menge und  $I$  eine abzählbare nichtleere Menge. Für jedes  $i \in I$  sei  $M_i$  ebenfalls eine Menge. Zeigen Sie (nur unter Verwendung des bisherigen Stoffes dieser Vorlesung):

1.  $M \setminus \left( \bigcap_{i \in I} M_i \right) = \bigcup_{i \in I} (M \setminus M_i)$
2.  $M \setminus \left( \bigcup_{i \in I} M_i \right) = \bigcap_{i \in I} (M \setminus M_i)$